

Artur Pliszko

## **OBSERWACJA CZARNOWRONA *CORVUS CORONE* NA POJEZIERZU ZACHODNIOSUWALSKIM**

### **An observation of Carrion Crow *Corvus corone* in the Western Suwałki Lakeland**

W dniach 2–9.08.2014 roku obserwowano jednego osobnika czarnowrona *Corvus corone* we wsi Garbas Pierwszy (gmina Filipów, województwo podlaskie) na Pojezierzu Zachodniosuwalskim (koordynaty: 54°9'45,24"N, 22°37'7,44"E). Ptak przesiadywał samotnie na dachu budynku gospodarczego i na jabłoniach w pobliskim sadzie na terenie jednego z gospodarstw. Miejsce to często było odwiedzane przez wrony siwe *Corvus cornix*, gawrony *Corvus frugilegus*, kawki *Corvus monedula*, sroki *Pica pica* i szpaki *Sturnus vulgaris*. Gatunek został zidentyfikowany na podstawie takich cech jak: gruby, czarny dziób, płaskie czoło i brak niebieskiego połysku piór (Nicolai et al. 2005). Cechy te pozwoliły na odróżnienie go od młodocianego gawrona, z którym bywa mylony. Osobnik nie posiadał obrączki.

Czarnowron gniazduje w zachodniej Europie, przy czym w wąskiej strefie hybrydyzacji, która przebiega przez Szkocję, Danię, Niemcy, Czechy i Włochy, tworzy mieszańce z wroną

siwą (Randler 2007). W Polsce zwykle obserwuje się osobniki niełęgowe, rzadko występują mieszane pary łęgowe czarnowrona z wroną siwą, a gniazdowanie par samych czarnowronów zanotowano tylko 3 razy (Żurawlew et al. 2010, Komisja Faunistyczna 2014). Ptaki niełęgowe najczęściej notowano w zachodniej części kraju, tj. na Śląsku, Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim, Pomorzu Środkowym, Pomorzu Gdańskim i w Wielkopolsce, rzadziej w Małopolsce i Krainie Świętokrzyskiej. W północno-wschodniej części kraju obserwowano go niezwykle rzadko, m.in. w Potrytach koło Olsztyna, Brzostowie nad Biebrzą, nad stawami Dojlidy w Białymstoku, w Hryniewiczach i Narwi (Żurawlew et al. 2010). W latach 1954–2009 w Polsce notowano głównie pojedyncze osobniki czarnowrona (aż 80% obserwacji), najczęściej bez towarzystwa innych ptaków, bądź tylko w towarzystwie wron siwych, sporadycznie z innymi krukowatymi *Corvidae* lub czajkami *Vanellus vanellus* i szpakami (Żurawlew et al. 2010).

Jak dotąd czarnowron nie był notowany na Suwalszczyźnie. Stwierdzenie w Garbasie Pierwszym jest najbardziej wysuniętym na północny-wschód miejscem obserwacji tego gatunku w Polsce.

## LITERATURA

- KOMISJA FAUNISTYCZNA 2014. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2013. *Ornis Polonica* 55: 181-218.
- NICOLAI J., SINGER D., WOTHE K. 2005. Ptaki. Encyklopedia kieszonkowa. Muza, Warszawa.
- RANDLER C. 2007. Assortative mating of Carrion *Corvus corone* and Hooded Crows *C. cornix* in the hybrid zone in eastern Germany. *Ardea* 95: 143-149.
- ŻURAWLEW P., CZECHOWSKI P., ŁAWICKI Ł. 2010. Występowanie czarnowrona *Corvus corone* w Polsce. *Ornis Polonica* 51: 262-274.

## Summary

In August 2014, one individual of *Corvus corone* was noticed in Garbas Pierwszy village (coordinates: 54°9'45,24"N, 22°37'7,44"E), in the Suwałki Region (north-eastern Poland) for the first time. This is the north-easternmost record for this species in Poland.

Adres autora:

Artur Pliszko  
Zakład Taksonomii Roślin, Fitogeografii i Herbarium  
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński  
ul. Kopernika 31, 31-501 Kraków